

8038  
2980  
v. 7

醫藥門下

故事新書

七

BERKELEY  
LIBRARY  
UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA



告目

[illegible]



種<sup>二</sup>  
芥







啟事新書卷之十四

日用門下

收筆法

收筆束坡以黃連蒿荳煎湯調輕粉蘸筆頭候乾收  
之不蛀○山谷以蜀椒黃蘗煎湯磨松煤染筆藏  
之不蛀○芥筆以硫黃酒舒其毫○洗筆法以瓦  
盛熱湯浸一炊久輕擺洗次却用冷水滌之若  
有油膩則以皂角洗之甚佳

造墨法

李廷珪造墨法清麻油十斤內先取三斤以蘇木一





兩半黃連二兩半杏仁二兩槌碎同煎候油变色  
放溫濾去滓傾入蘇油中攪勻掘地安盞深淺令  
與盞米<sup>半</sup>滿添油注燈以尾盞約面闊八九寸底深  
三寸許者竅之仍用方寸尾尾搭起三面不可太  
高又不可太低每一炊久即掃一度只可作十盞  
盞多則掃不徹每烟四兩半用黃連半兩蘇木四  
兩各槌碎水二盞同煎五六沸候色变用熟絹濾  
去滓別用沉香一<sup>錢</sup>半煎留水四兩許再濾次用  
腦半錢麝一錢輕粉一錢半以藥汁半合研化先  
將藥汁入乾膠一兩一錢五分同熬不住手攪令



溶後入腦麝汁攪勻乘熱傾入煙內就無風處速攪和次就葉上團揉候光可照人方印作錠子預無風處罨五六日候乾取出淨刷收貯○造膠法黃牛皮水浸透拔去毛仰攤在平板上取生黃土勻撒皮上良久以小刀刻去筋膜搜水頻洗研碎入無油膩鍋內水煎成膠傾出薄攤竹篦子上風乾

韋仲將合墨法以好紙烟搥訖以細絹篩於缸中煙一升光以好膠五兩沉枰安枰江南樊雞木也其皮入水綠色汁中可下鴉子白去五枚亦以真朱紅大一兩麝香



一兩皆別治細篩却合調下鐵臼中寧剛不宜澤  
搗三萬杵多益善合墨不得過二月九月溫則  
敗臭寒則難乾漣涇見風自破碎仲將之墨一點  
如漆

今俗造墨法紉烟十斤阿膠四斤水十斤以水九斤  
浸膠盛銅盆置火上待爛以烟和訖以餘一斤水

洗盆盛別甕搗時用水揮洒搗期萬杵又以不染  
掌方度作丁時浸薄印出於此室中平板上布濕  
灰一寸許令平次布紙二上攤墨三上布紙再布  
濕灰一寸許經三夜或一夜後每丁割四方令正



又布乾灰一寸許於板上如前布紙於墨上下又  
布乾灰一寸許經三夜或一夜出攤於此室中平  
板上數日翻覆以堅為度

造松烟墨法多取松烟入布袋熟待乾製造可膠及  
水并兩如上造法作丁時大小厚薄隨宜但必以  
萬杵為度無異真墨

藏墨法用熟艾和收過梅月藏石灰中不染口若墨  
以豹皮囊者亦遠濕也○肥皂浸水磨墨可於油

紙上寫字

推紙法



乾紙十張

外酒濕

一張當上如此重疊當起以百張

評

乃一塊放平正案上又以手面板壓在上以大石  
壓之經一伏時上下乾濕皆勻於石上勻搥二三  
百下皆著涼於百張內將五十張晒乾却與濕者  
五十張乾濕相間皆了再勻搥二三百下依上晒  
乾一半又乾濕相間皆了如此三四次直至無一  
張沾粘乃度再以石碾三四次倒下搥勻直至光  
滑如油紙○若紙以芙蓉粉飾其色也○曰香山  
常用蔡版綠色而澤入墨覺有精采其法抹帶磨  
蜀葵葉汁用布揩抹紙上俟少乾用石壓之



# 洗硯法

凡硯須日滌之過二三日墨色差減雖未能滌亦須  
易水春夏蒸濕之時墨久留其間則膠力滯而不  
可用尤要頻頻滌去○洗硯不得使熱湯亦不得  
用鹽片故紙常按皂角水洗之乃得○洗硯用蓮  
蓬殼蓮房身或枯炭或半夏切平擦之大去滯墨

## 竹硯滴法

銅性猛烈貯水久則有毒多脆筆毫磁者本好而莫  
若竹取節長二寸許以小竹挿作嘴甚是標格清  
致誠野人之物也



書畫諸法

書絹帛法用生薑磨墨則不滲用絹擦絹上則寫字  
易工

藏書畫法凡書畫於梅雨前晒令極燥書則頻刷畫  
櫃畫則捲入匣厚以紙糊櫃匣小縫令不通風過  
梅月方開則不蒸蓋蒸氣自外而入故也古人藏  
書多用芸香辟蠹麝香亦可一法用樟腦亦佳  
洗書畫法將書畫鋪平染上取水勻噴濕後令四面  
平穩用馬尾刷子蘸水石末如一錢厚再噴濕  
又羅旦英灰和前後便半時衣以溫水衝起如有所



損取燈草揩即淨潔如是墨汚須用一伏時方以  
溫水衝起墨跡即去書畫蒸濕或滷者用冬水  
或銀杏蒜洗之。墨汚書箱用燈草蘸水洗即去  
裱書畫法先以盪貯水緩傾好麪於水上任其自沉  
不可攪。則有塊置盪淨室中夏七八日冬半月  
候極臭敗徐去水別用新水及胡椒煎水調攪  
令勻煮極熟稍硬取出作大團入石灰湯浸之臨  
用取出量稀稠添熱湯爛研以布絞濾每一碗入  
白礬末兩黃蠟二錢半和勻用之不用礬則有半  
蟲蛀蒸傷之患凡裱碑文及綾帛須用硬糊即不



失光者潤透則失光矣○麪一斤浸水夏五日冬

十日待臭漚出白芨五錢白礬三分水煎去滓和  
麪打成濃糊入桐油黃蠟芸香各三錢重就鍋內  
打作一團別撮水煮令熟去水傾置篋內日搜水  
浸臨用以湯調開

### 造燈燭法

製造書燈法以薄木板作之如木櫃狀墨漆寬五六  
寸只可容一燈蓋高八寸頂有圓竅徑三寸前有  
手捻掛起則燈光直射於書上其明倍於席燈○  
香油一斤入桐油三兩耐點又辟鼠耗以鹽小許



置盞中亦可省油以生薑擦盞邊不生暈○以蘇  
木煎燈心曬乾炷燈則無燼○立春前一日或臘  
前一日以水浸燈心小時晒乾收之夏月點燈則  
蚊蚋不近○桃燈杖二月初二日或清明日五更  
未出時不語採薺菜梗陰乾作桃燈杖諸虫永不  
入燈盞內

耐點蠟燭法黃蠟松脂槐花一斤浮石<sub>水汽</sub>四兩各  
同一處溶用灯心有澆一晝夜僅點一寸○風前  
燈乾漆搗細金沙硝石硫黃各一兩黑豆末瀝青  
黃蠟各一兩先溶瀝青黃蠟成汁後入前件漆和



以旧布火上攤作條燃風前不滅一云用蜀葵積風雨中亦不滅  
○萬里燭黃花地丁及皂角花松花槐花各二錢  
蜜一斤同煎熬沸瀝出入白芨二錢候赤暈時退  
火已凝結矣

引光水前松明乃小瓦薄如紙鎔硫黃塗其說夜有  
急用是將火即燃或用樟皮燒太急易滅不如松  
明之耐久也

### 留宿火法

炭十斤鐵屎一斤合搗成末生芙蓉葉三斤再搗入  
糯米膠和捏作數炭晒乾燒紅三日不滅○汝胡



桃一箇燒半燃灰埋三五日不爐○造香炭以石  
灰無則木炭亦可同生葉搗和乃餅曬乾焚香雖冷濕  
地火亦不滅

### 造爐香法

爐香山居不可缺取老松百根枝葉涼搗碎之研楓  
肪和之每焚一丸亦是取清苦

### 造枕褥法

石枕云如磁石如無大塊以碎者琢成枕面下以木  
簾最明眼明眼者無如此枕可老而不昏○菊衣  
枕秋採甘菊花貯以紅布囊作枕用能清頭目去



邪穢

神枕五月五日七月七日取山林柏以爲枕長一尺

二寸高四寸座中容一斗二升以柏心赤者爲蓋

厚二分鑽蓋上乃三行四十孔凡一百二十孔

令宿采米大用葉芎藭蒲歸白芷辛荑杜蘅白朮

藁本木蘭川椒桂皮乾薑防風人蔘苦苣白茯苓

剉碎肉菰落飛廉柏葉蒼朮欬冬花白薇秦椒靡

蕪凡二十四物以應二十四氣加毒者八物以應

八風烏頭附子藜蘆白英茵草礬石半夏細辛凡

三十二物各一兩皆剉以毒葉上安之滿枕中用



布囊以衣枕後以韋囊重已二臨卧時脫之蓋  
防真氣外泄也枕之百日面有光澤一半體中諸  
疾皆愈而滿身盡香四年日髮變黑墜落後生耳  
目聰明神方驗秘不傳非其人也

蒲花褥採蒲花和柳絮者熟鞭

一云採蒲略蒸晒燥而花

野以方

青囊作坐褥或坐褥甚溫煖木綿不及

### 拄杖法

拄杖法以班竹為上竹欲老瘦而堅硬班欬微赤而  
點疎○點班竹法石砂五錢班描一錢石炭一錢  
用醋調點竹上火燻之成色



掛琴法

琴不宜著壁有土氣非板壁上好妙

磨劍法

磨劍不可滑用水及磨石當以香油就臍石慢磨去  
鏽却用打鐵爐邊打落鐵鏽三兩入木炭一兩  
水銀一錢同為末糝劍上以布凡蘸油耐久磨擦  
其光如鏡錦文拭淨以酥塗掛起永無鏽也松菜  
子作油塗之口鼈鼠皮毛頻拭鐵物則良也木  
賊擦之鏽自落

軟玉石法



礬除脂塗玉則刻之如瓠但不可多得取肥者煎膏  
以塗玉亦軟滑易截古玉光有奇特雕琢非人功  
者多是昆吾刀及礬煉所刻也○地榆根燒灰能  
爛石礬煉灰以塗石亦能爛

### 粘尾石法

榆白皮濕搗如糊用粘尾石極有力○白膠香真者  
一兩黃蠟瀝青各一錢香油一滴尋所壞石同色  
者搗為末和作膏烘熱粘之此乃補石神膠也如  
粘山石斷者則去石末加蛤粉調乾粘之○鷄子  
白和白礬末粘磁器甚好



水痺不逃自還法

張華物類相感志曰以甌帶麻作線左緊之縫水痺  
衣脊一尺六寸即無逃之心○張華志曰取逃  
人衣裳井中垂運之則逃人自還本草曰取逃人  
髮於鑄車上却轉之則逃礼不知所適云片俗以  
紙書逃人姓名貼梁上亦此類也

辟寒法

取天門冬白茯苓等分煮末酒服二錢日再則大寒  
時單取汗出○清一匙吞下最能禦寒

辟墓中同家燭法



朱轂子曰同家壯食止人肝腦而畏虎與柏故墓上  
樹柏墓前立虎又小說曰地中有物名燭食死人  
腦以柏屑其首則死故墓前樹柏云

### 夜行辟鬼火法

說部曰入田野中見鬼火以鞭兩鞭相叩作辟鬼火  
即滅

### 入山辟妖魅法

入山則山精老魅或作人形膚變明鏡九寸於背後  
其形在鏡中則不能變消亡退步

### 辟虎狼法



入山林誦儀康不怕虎狼○夜行勿歌唱大呼虎豹  
夜聽人唱拜追辱之

避龍止免哭法

用錦作一小毬略使滿口而不致閉其氣以甘草煎  
湯或甜物漬之臨時縛直吮口中使燕其味吮口  
有物凉之自不能作拜而錦軟不傷兒口蓋不幸  
而遇禍難啼拜不止恐為賊所聞棄之道傍哀哉  
用此法活人甚眾不可不知

避礼解烟熏法

有人避礼石瘡以烟火熏之迷罔欲死得薜蒿嚼賊



汁下咽而甦蘿菥子水研取服亦解

避亂救飢法

避亂大遁丸黑豆一升去皮貫衆甘草各一兩茯苓  
蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆慢火熬煎  
直至水盡揀去藥取豆搗如泥作芡稯大磁罏密  
封每嚼一丸則恣食苗葉終日可飽雖草殊木菜  
素所不識亦無毒甘甜與進獻同○又一方黑豆  
一升貫衆一升同煎○藥津服水法飢飲碗虎便  
開口以舌攪上下嚥取津液嚥之一日得三百六  
十嚥便佳漸習乃可至平自然不飢三五日疲極



通此便漸強若有水處卒無光便以左手掬水吮  
曰丞掾吏之賜真之糧正赤黃行無過城下諸醫  
以自防吮畢三呷遠右手指三呷左手如此三遍  
便飲之有杯光貯水尤佳如法日服二升便不飢  
○服六天氣法春食朝霞日欲出時向東氣也夏  
食正陽南方日中氣也秋食飛泉日欲沒時向西  
氣也冬食沆瀣北方夜半氣也并天玄地黃之氣  
是者六氣皆令人不飢延年無疾一云平明為朝  
霞日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣并天玄  
地黃為六氣昔有人誦穴中其有神蛇每旦作此



氤氲之其人依蛇時節飢時便服日三和之久漸  
有驗如能輕氣胎塾之後人與蛇一時躍出

### 辟蟲法

辟蛇法存鵝能辟蛇○燒殺羊角蛇即遠去○四辟  
柱上用倒流水研墨書龍字貼之○多用小瓦磚  
尾隨儀方二字置四處蛇是目畏也○端午日午  
時用朱砂寫茶子貼之蛇蝎不敢近○清明日取  
戌方土煎狗尾作泥墜戶內孔穴則蛇鼠蟲諸永  
不敢入○凡行山路帶雄黃在身或研水塗腳心  
蛇目遠辟不敢近○凡入山林默念儀方不見蛇



與

燕巢引蛇書成字貼於燕至處則不來。用白紙朱書鳳凰二字貼巢上即去。

辟鼠法用木刻猫兒一箇以赤鼠屎調粉畫之鼠見自走。用黑犬血和鹽燒之諸鼠悉去。大雄鼠一箇割去其勢放之滿屋自咬鼠死似猫。荷花梗塞鼠穴鼠自去。每月辰日四要曰正塞鼠穴則自無鼠。遇辰日以物塞鼠穴鼠自斷。逐月庚辰日子辰日并滿日及正月上辰日塞鼠穴。三月庚午日斬鼠尾取血塗梁可永辟。中薈子



殼似草麻殼有刺尖有倒鉤鼠甚畏之者其體粘  
住即死故一名鼠粘子置於鼠穴可逐鼠

辟蚊蟲法書風字間字在庭間壁下則無○用浮萍  
葉法乃未焚之蚊蟲自死○用蠶殼夜明砂者末  
燒之○夜明砂燒烟可辟蚊蟲○凍夜五更使一  
人牽中向堂扇一人問之扇甚的答云扇蚊子則  
無蚊蟲○端午日五更依前法扇向蒼龍驢○端  
午日取大蝦蟆一箇用好墨一塊入於口中解線  
縛住取正午時方掘一穴深五尺埋之至第二日  
午時取蝦蟆口中墨於壁上畫葫蘆一箇用淨水



噴三日蚊子盡入葫蘆內不可打殺欲其去時用  
扇去取墨蝦蟆活則驕。端午日用麻線一條  
圍床周匝以蝙蝠血塗遍繫床四面絕蚊蚋。端  
午日取浮萍陰乾燒烟蚊子自去。一云去蚊蚋及蜈蚣  
鰻魚乾者燒屋中蚊化為水。端午日用  
臘水洗屋下無蚊蠅。○用土閉日泥壁用水閉日  
掛帳則無蚊蠅。

辟

蚤虱法用菖蒲葱浮萍各一尾斤尾末每用半盞許  
撒於席上次日皆自死。治狗虱同○乾菖蒲細切填席  
下又以麝香少許着在薦上皆可去之。○用臘膏



水日洒薦席能去蚤虱。○凡人洗濯衣服於粉粧  
內入水銀小許研勻糝衣其後虱永不生。○帶砒  
礪辟蚤虱。○辟拘蚤法用菖蒲末糝席上極驗。○  
用茯苓末糝茵席下。○用杉木心瓦鋪床下。○清  
明日用熨斗內著火炒枣子於床下帳內上下令  
煙出令一人問炒甚的答云炒狗蚤七問七答則  
拘蚤不生。○端午日用熨斗燒一棗置床下辟狗  
蚤。亦治壁虱○三月三日收薺菜花鋪床席下去  
蚤。○辟壁虱法用紙書欠我青州木心錢七字貼  
於床脚上忽然不見一云張三願買了木心不還



錢一匙三十年寫此貼床脚上亦驗○用白馬蹄  
於床下焚燒煙盡化為血○用麝香殼三個為  
末置席下即去○用薤葉晒乾鋪席下即涂○萍  
燒燻之即去又辟蜈蚣○辟蜈蚣法用石菖蒲神  
麝白礬各半兩硝石一分黑錫一兩銚內鑊錫入  
礬硝研成粉入菖蒲麝末以水同煮綿帶子不拘  
多少一炊久候乾一條以水銀一錢於手內唾調  
如泥搓擦帶上用繫腰及頭衣服上永無蜈蚣○  
人多虱者將及冬用水銀二三錢臘茶末一錢於  
掌內以津唾調勻將餅作繩按勻在上以絹作帶



裏之繫於腰間。用百部秦苑各一兩各搗為末

燒煙放衣熏籠上熏之。虱自盡落。若用二味煮湯洗衣尤妙。

辟頭虱法用藜蘆為末。糝髮中經宿。虱皆自落。藜蘆

百部同搗為末。用輕粉少許。糝頭上一二日。虱

皆盡死。

辟蠅法。端午日午時寫白字倒貼於柱上。四處則無

蠅。用臘雪水洒几牀上。蠅自去。臘日用瓶光

盛猪脂四五兩。緊封瓶口。堂上房中厨內各懸瓶

一。瓶。腐夏雖有蠅。十去八九。臘月八日懸猪脂

於厨上。一家無蠅。元日午朝用鹽豉吞七粒。終



歲不在倉中誤契蠅子

辟厨间諸虫法三月初二日鷄鳴時以滿甕冷炊湯  
澆洗甕口及飯甕及一應厨物永無百虫游走乃  
害○三月三日收薺菜花鋪甕上去虫蟻○辟井  
瓮虫法清明前二日夜鷄鳴炊黍米熟取釜中湯  
遍洗井口瓮邊地則無馬蝗百虫不進井瓮甚驗  
○烏賊骨投井中虫盡死

辟諸物被蛀法用芥草燒烟熏之則蛀虫皆盡○七  
月收角蒿置毡褥書籍中辟蛀虫○鰻鱧魚燒熏  
鹽中制蛀虫置屑箱中制白魚免諸虫咬衣服燒



熏竹木辟蛀虫。芒蔭置書中無蠹患。竹篾生  
蛀用生桐油點蛀處則止。辟衣帛虫蛀法端午  
日取蒿草葉置於厨橫中則蛀虫不生。辟皮物  
虫蛀法七月七日晒曝草束無虫。以艾葉搭於  
皮內放在篋中泥封篋口或用花椒在內捲收之  
亦可。毛衣用無油漆板匣收貯紙糊板縫不通  
風則不蛀。

附雜忌

酉陽雜俎曰形不欲照水照井及浴室中所謂行不  
履影亦以意也又曰浴請五月上屋言五月人乾



上屋見影魂庸之○山居四要曰凡卧歌詠大不  
祥世言夜卧喜歌者多夭蓋以此也○漢和帝時  
初法令閉盡日詩伏日萬鬼行散盡日閉門不干  
他事程曉伏日詩平生三伏時道路無行車○祝  
部曰賣宅之財買奴婢及生物并不利於人賣驢  
馬之財不聘婦令家耗不安○每月初六十六二  
十六日勿登廁之神守廁日也



故事新書卷之十五

醫藥門

忌銅鐵藥

玄蔘忌銅鐵餅之噎人喉喪人目

葛蒲忌鐵令人吐逆宜用銅刀竹刀

地黃忌銅鐵令人暗消髮白

香附忌鐵宜用石臼中搗

何首烏忌銅鐵則必連三消

杜冲忌鐵宜新瓦上乾木臼中搗

紫胡忌銅鐵宜用竹刀

沒石子并忌銅鐵

天門冬忌鐵則患

肉豆寇忌鐵

麥門冬三消

桑白皮忌鐵及銅忌鐵則患三消

知母

桑枝木凡諸根并忌鐵宜用銅刀

黃柏忌鐵

牡丹皮

并忌

桑寄生

并忌

桃木

并忌

骨碎補

并忌

益母草

并忌

石榴皮葉根

地骨皮

白馬莖

忍冬草

草龍胆

楮荅

諸藥食忌

服藥通忌生菜

餌藥人食鹿肉不得藥力蓋鹿恒食鮮毒草能制諸藥

服諸藥不可多飲醋

服藥不可多食生葫荳及蒜果雞犬肉肥美魚膽等物

凡使一切用大忌鹽

有茯苓勿食酸醋等物一之忌米醋蓋服茯苓忌醋則前功俱解



有細辛勿食生菜

有蟹甲勿食莧菜

有常山勿食生葱松菜

有桂勿食生葱

蜜忌生葱萬宜

蓮衣忌地黃及蒜

麝香忌大蒜

有收丹勿食生胡荽又白牡丹皮忌蒜

有地黃勿食葱蒜薤藠

有何首烏勿食薤藠無鱗魚服地黃何首烏而食薤藠則能耗諸髮髮早白

有木勿食大蒜胡荽桃李雀蛤青魚鮓食桃或死

有甘草勿食苳菜海藻猪肉一云服甘草而食苳則藥除  
有黃連苦葷勿食猪肉

服黃連至三年則不得食猪肉一云黃連又忌冷水

胡黃連忌猪肉食則漏精

有蒼耳忌食猪肉米泔

有巴豆勿食蘆笋羹野猪肉及醬豉冷水

有牛膝勿食牛肉

有商陸勿食犬肉

有藜蘆勿食狸肉



破故紙忌羊肉

有半夏菖蒲勿食羊肉海藻飴糖

陽起石忌羊肉

銀及水銀輕粉忌一切血

有朱砂空青勿食生血物

龍骨忌魚

有麥門冬勿食鯽魚

有天门冬勿食鯽魚誤食中毒則浮萍解之

枸杞與乳酪相惡

乾漆忌油脂

服黃精禁食梅菜

楮膏忌烏梅

杏仁忌粟米

雀歸忌熱麵

威灵仙忌茗及麵湯

厚朴忌豆食之動氣

烏頭天雄忌豉汁



臘藥用法

清心元 治不語恍惚煩鬱痰熱傷寒發熱心氣不

足神志不安一切病發熱等證又治卒中風不省

人事痰涎壅塞精神昏憤言語蹇澀口眼喎斜手

足不遂每服一丸溫水化下

蘇合元 治傳尸鬼氣卒心腹痛霍亂時氣瘴症暴

痢赤白月閉瘕癖小兒吐乳大人痼疾等疾大能

順氣化痰又治一切氣痰及中風上氣二逆氣鬱

氣痛○有龍腦則名龍腦蘇合元每用四丸早朝

空心井薺水下或溫酒下

牛黃涼膈元

治上焦壅熱風痰蘊積口乾喉痛唇

焦頰赤口舌生瘡渴而不安用一丸又治小兒急

驚用半丸并薄荷湯下又治咽喉腫痛口舌生瘡

頰頰赤腫熱痰壅塞

加減薄荷煎元

治頭目眩昏口舌生瘡痰涎壅塞

咽喉腫痛津風熱消瘡疹又治風熱咽喉腫痛一

名龍腦川芎丸每用一丸瀉化嚥之

龍腦膏

治證與薄荷煎元同

神保元

治諸氣注痛又治心膈痛腰脊痛睛氣痛

每五七丸薑湯溫酒任下



感應元

治虛中積冷氣弱有傷飢飽飲食心下脅

間堅滿霍亂嘔吐久痢赤白膿血相雜米穀不化  
中酒嘔吐惡心頭旋四枝倦怠壯熱傷寒小兒傷  
滯赤白或進或退綿不絕又治積痢久痢赤白連  
膿血相雜每用一丁米飲調下或作丸菜豆大十  
丸吞下

溫白元

治心腹積聚癰癥積年食不消下黃疸鼓

脹十種水氣八種痞塞五種淋疾九種心痛遠年  
瘧疾及癰七十二種風三十六種尸疰癰狂邪祟  
一切腹中諸疾溫酒或井華水

好合茵陳丸 治天行病急黃疸及瘴瘧發黃三九

或五九溫水下

九味清心元 治證與清心元大同小異治熱之功

尤捷

至寶丹 治中風不語諸毒山嵐瘴氣痧水毒產

後血暈同祀雜症又治小兒諸癇急驚卒中瘡疥

不得眠煩燥風搐每用二三九至五九人蔘湯下

或小便和薑汁用之又治卒中急風不語不省人

事及風中臍精神昏冒

至聖保命丹 治小兒胎驚內弓腹肚堅脹目睛上



視角可反張一切急慢驚風痰涎等證又治急慢  
驚風及胎驚天予初生小兒半丸乳汁下周歲兒  
一丸薄荷湯下十歲以上二丸薄荷湯下

催生丹 治產婦生理不順產有艱難或橫或逆每

用一丸溫水下

水煮木香膏 治脾胃受濕臟腑滑泄腹痛無度腸

鳴水聲不思飲食每欲下痢裏急後重或下赤白  
便膿又治一切諸痢每一丸水一盞煮一枚同煎

四五沸和 食前服

九痛元 治九種心痛及卒中惡腹脹痛口不能言

痘

又治連年積冷流在心膈并墜落湯損又治九種心痛及積冷心脅痛三五丸溫酒下

瀉青丸 治肝熱急驚搐搦每用半丸或一丸竹葉

湯或砂糖水化下

稀頭兔兒丸 初生小兒二三丸乳汁送下一歲兒

五丸或七丸三歲後十五丸久服則遍身發出紅

斑是其驗也臘日或初八日為丸

錢氏安神丸 治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱又

治急驚風及心熱驚啼每用一丸砂糖水化下

木香保命丹 治諸風痙瘓中風口噤手足偏枯頭



目昏暗心神恍惚及諸般冷氣又治中風一切諸證每用一丸細嚼酒或熱水下或沉酒服之

捉虎丹 治四氣乃脚氣無問遠近一切注痛臨發

時度心一丸趕到脚面上必赤腫痛不欲服一丸趕到肺心中出黑汗乃除根又治中風癱瘓手足麻痺不仁偏枯不得屈伸每用二丸溫酒下

保安丸 治產前產後諸疾每用一丸溫酒下

紫金丹 治盡毒桃生毒批裡鼠蟻毒河狹疔牛

馬肉毒山嵐瘴氣毒諸藥金石草木鳥獸百毒一切諸毒自鎔落水是迷驚死心頭溫者并冷冷水

磨薩蛇犬湯酒磨調下每用半碗或一飯薄荷湯

下

靈寶丹

治推下積滯一切無名惡瘡毒腫每用一

匙涼水下和飲三五行先吞凉水三五口

萬病元

治七種癰塊八種痞滿五種癰痛十種症

將七種飛尸十二種喪毒五種黃疸十二種瘧疾

十種水痢八種大風十二種濕痺及積聚脹滿久

遠心腹痛疳蚘寸白諸虫久積痰飲消瘦疲困或

婦人子臟瘀血凝滯因此胎產服此藥以三九為

一劑不過三劑其病悉除說無窮盡似稀為萬病



元用之以注利居度

小兒清心元 小兒諸熱及驚熱煩燥每一丸用竹

瀝下

抱龍丸 治驚風潮搐身熱昏睡狂下痰熱百日内

兒一丸 三分用五歲兒一二丸溫水化下

玉樞丹 治法與紫金丹同

膈享膏或玄蠟膏 治諸凍瘡不差臨用以藥水

先洗後塗諸瘡皆可

神聖辟瘟丹 辟瘟正元焚二炷四季保平安

備急元 治心腹諸暴百病已死者折墮灌之中惡

④ 客肝丸 每用三丸

解毒雄黃元

治喉閉口禁水嚥不下急危者每用

七丸茶清下若口禁醋和灌鼻

鬼哭丹

治癆瘵每用三十丸隔夜臨睡冷酒吞下

次日早再服

勝金丹

治諸瘡久不愈服法上同

脾寒丹

治諸瘡

安胎丸

治懷孕四月常墮服七一二丸白湯下

解毒諸毒

凡解毒之藥皆不可熱飲能使毒氣愈甚宜冷服之



乃效。○手足面青過時者不效。治法上宜吐之急  
以香油芎藭鵝翎探吐之下以芒硝甘草湯調服  
利之。○人自服毒者宜急救之大法甘草葉豆能  
解百毒。又法不同何毒芎藭香油吐利即安。○通  
治百毒物細茶白礬每兩三錢末新水調服即效  
又五倍子為末好酒調下二錢在上即吐在下即  
瀉。又甘草細末微炒隨酒量多少好酒調服須臾  
大吐瀉雖渴不可飲水則難救。又臘雪水兩飲水  
飲之。○甘草黑豆皆解百藥百物毒各兩五錢水  
煎溫冷任意服神效。或加芍藥或薺芫尤效。○凡

中毒即燒所食之物作末服之

鮮一功飲食毒

中毒煩悶甘草薺花濃煎湯飲之入口即活又白扁  
豆末水調服二三錢得利即安又人屎取汁服之  
又白狗糞和水絞汁又藍藤或藍藤濃研汁飲之  
又牙飲香油即差

解熱麵毒

枸杞根皮煮汁飲之又薺薑汁飲之無生者則取子

水研

汁飲之又杏仁研煎汁飲之

解豆腐毒



過食腹脹氣壅欲死新汲水多飲即止若飲熱酒即

死又薤薑汁

煎湯

飲之又杏仁研煎濃汁飲之○

過飽發死著垢組或者垢衣頭皮水洗飲之即解

### 解燒酒毒

過飲中毒面青口噤昏迷不省世則腐爛腐骨通體

青黑吐下血死在須臾初發便脫衣推身滾轉之

無穀吐之則甦又以溫湯裸體浸灌常令得煖若

灌冷水即死又急取生瓜及蔓摠取汁灌口灌

之不住又碎冰納口中及肛門以醒乃度又葛根

搗取汁灌口中○柿葉搗汁灌之

解諸數肉毒

食六畜肉中毒或吐下血胡荽子二升碎煮取汁冷  
服半升日二又大麻燒灰和酒服一錢又生韭汁  
一二升飲之又人頭垢和水服吐止即愈又水浸  
豆豉絞取汁數升服之○食諸肉中毒煮橘皮汁  
或蘆葦根汁或黑豆煎汁或大黃煎汁或川椒煮  
汁可飲○鳳仙花根莖葉取汁飲之又飲好酒大  
醉即解又生山藥水磨服神效

食牛肉中毒甘草濃煮飲一二升即愈○人乳汁一  
二升飲又黃柏末三錢和水服又牛黃和水服○



韭汁或人屎汁飲之又人頭垢熱水調服吐也  
食牛肉脅間刺痛不可忍手足青黑頃刻間氣絕  
者三四卽服野人乾一盞無效又服一盞脅間急  
痛如裂有如脫落之聲聞傍人其痛卽止累試  
神效又牛黃五分服之卽效累試皆驗○食牛肝  
膈忽然咽喉疼痛不可開口視之則喉嚨間毒肉  
亂生或如肝片或如重舌狀頃刻間咽喉閉塞氣  
息奄奄急以鍼孔刺毒肉生處出血一二升吞水  
漸差

食馬肉中毒韭汁飲之又犬屎燒灰和酒服又蘆根

煮取汁飲一二升又多飲水清酒至醉即解酒

則又加香豉二兩杏仁三兩和蒸一炊久熟杵服

日二

仁云只取者仁嚼吞亦效

○食馬肝中毒人頭垢和水

服又雄鼠屎三七枚研和水服

食枸朮中毒蘆根煮汁飲之又杏仁去皮收研水煎去

滓飲利下血危為效

熱湯三盞拌白分三服所食

肉皆金尾鴈出

食羊肉中毒煮甘草汁一二升飲之

食生肉中毒地漿飲之

掘黃土地作坎以水沃其中攪合濁飲之是謂

地漿



食日死禽獸肉中毒黃柏末三錢水調服不解再服  
又人頭垢一錢熱湯化服又黑豆煎汁藍葉汁人  
糞汁皆可服

食中毒箭死禽獸肉中毒裡骨燒灰和水服又黑豆  
汁藍汁飲之

解諸禽肉毒

食鴉鴉肉中毒糯米泔或溫酒飲之又秫米水研取  
汁飲一盞

食雉肉中毒吐下羣用末和水服一錢或以水濃磨  
取汁飲

食野鳥肉中毒裡骨燒灰和水服又黑豆汁藍汁飲之

鮮諸魚毒

食魚中毒飲冬瓜汁最驗又濃煮橘皮汁飲之又海

棣皮似獺犬尾著煮汁飲之又鯨魚皮有真木賊生海中燒灰和水服○大豆汁紫蘇汁服

之

食鱸魚中毒蘆根煮汁飲一二升生汁亦可

食鱉蟹中毒鼓一合投新汲水半碗取濃汁頓服即愈



食河牀中毒諸魚中河牀最毒其卵尤毒中者又死  
急取蘆葦根搗取汁飲之或人糞汁或香油多灌  
吐出即愈又白礬末白湯調下又白扁豆末和水  
服又羊蹄葉搗汁飲之○藍汁服又煮秦皮飲之  
又槐花末三錢新汲水調服或煎服又紫蝦鹽或  
生造紫蝦喫之

鮮蟹毒

蟹未經霜者有毒中之者飲生藕汁冬瓜汁煮蒜汁  
並佳又紫蘇葉煮汁飲之又黑豆汁豉汁并解之  
中毒或死急取冬瓜紫蘇葉大黃汁解之即差  
蘆根汁解之

鮮生膾不消

食膾不消生薑汁飲一升即消又曰久不消成癥取  
水中石子數十枚燒赤投五升水中七次熱飲三  
五交瘡利出癥○食厥腦髓即消

鮮魚肉不消

食魚肉不消成癥作痛枸糞五升燒存性為末綿裹  
清五升酒中銑痛兩清分十服即差○凡過飽魚  
肉積滯不下者食厥腦髓即消

鮮諸菜毒

食諸菜毒中烏鵲屎燒研末一錢和水服又香油多



飲之即安又葛根濃煎汁服之生津尤佳又甘草湯飲之又人乳汁或小兒尿服二升即愈

### 解茵葦毒

茵葦夜中光者煮不熟者煮訖照人無影者皆有毒人中其毒急取地漿飲之又人糞汁飲之又馬齒根葉搗汁飲之又人頭垢和水服以吐為度又六畜及鴉鴨之屬刺取熱血飲之又油煎甘草冷飲只少飲香油亦好○瓠瓢燒灰和水飲之○中葦毒吐瀉不止細茶芽即雀舌茶為末新汲水調服神效又荷葉搗爛和水服○楓樹菌食之令人笑不止

而死飲地漿最妙人糞汁次之飲藥不能救

解苦瓠毒

食苦瓠吐利不止則死飲黍稷灰汁解之○稷末研  
取汁飲之即愈

解海棠毒

凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即  
安神效

解諸果毒

食諸果中毒桂皮濃煎飲之又楮骨燒灰末一錢和  
水服又瓜蒂末一錢溫水調服吐之即愈



食銀杏中毒香油多飲吐之又地漿藍汁甘草汁飲

之

食桃得病取桃葉燒為末和水服即愈

食雜菰果子過多腹脹氣急桂心為末飯丸菰豆大  
以水吞下十丸未愈再服又桂心末五錢麝香一

錢飯丸菰豆大白湯下十五丸即效

治茄毒石首魚炙食或煮汁服自消

### 解諸藥毒

服藥過劑或中毒煩悶欲死葛根搗取汁飲之或水  
煮取汁服之又藍葉或藍屎搗汁飲之又地漿飲

之又生鵝卵取黃吞之又粳米粉和水服之又豉  
汁飲之甘草濃煎服之又薺苳取汁服又黑豆煮  
汁飲又甘草黑豆薺苳同煎服之尤佳又韭汁飲  
之○真黃土煮取汁煖飲之又六畜及鴉鴉皆取  
熱血飲之即差

巴

豆毒令人大吐瀉煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯

冷服又菖蒲或葛根搗取汁飲之更以冷水浸手

足忌食熱物又藍布砂糖搗爛和水服又黑豆煮

取汁飲又鹽水石磨水飲之

烏

頭鳥也天雄附子毒鳥頭鳥喙天雄附子側子皆一物也形似烏頭者為烏頭



兩歧者為烏喙細長至三四寸者為天雄根中者  
傍如芋散生者為附子傍連生者為側子

心煩燥渴甚則頭涇然遍身皆黑死甘草黑

豆濃煎服入口即愈又黑豆黑豆煮汁冷服之又

乾薑煮汁冷服之又多飲冷水大吐瀉即愈

草烏毒令人麻痺暈倒甘草黑豆濃煎汁飲之又生

薑汁飲之乾薑煎汁亦可又童尿飲之

莨菪毒令人大煩渴眼生星火狂走見鬼水研葉豆

汁飲之又甘草薺花煎汁飲之又甘草黑豆濃煎

服又鮮薑汁服之

大戟毒

即澤漆  
極也

令人冷泄不禁薺花煎汁飲之又葛

蒲搗取汁飲之

根毒毒杏仁研水和取汁服又藍葉汁飲之

藜蘆毒令人吐逆不止葱白煎湯飲之又溫湯飲之

又雄黃末和水服又香油多灌之

躑躅毒令人恍惚吐逆山梔煎汁飲之又甘草黑豆

煎服香油多灌之

半夏南星毒生薑汁飲之又乾薑煮汁服之

苦練根毒令人瀉不止飲冷粥止之

杏仁毒杏子雙仁誤食也死藍葉汁飲之又藍涼水

研取汁飲又地漿飲二三碗又香油多灌之



川椒毒誤食椒戟人咽喉氣閉欲絕喫大棗三枚解  
之誤吞合口椒氣欲絕身體冷痺急飲井水一二  
升便差又地漿飲之又飲黑豆汁或人尿 葵菜  
汁或飲之

班捕荒青毒令人吐逆不止急用菜豆或黑豆或糯  
米和水研取汁服又藍汁飲之又猪肪服之

艾毒艾葉久服亦有毒發則熱氣冲上狂燥不能  
禁至攻眼有瘡出血者甘草黑豆煎湯冷服之藍  
葉汁菜豆汁飲之

解石藥毒

人服諸石藥中毒人蔘煮汁服又鴈肪服之又白鴨  
屎乃末和水服

礬石毒黑豆煎汁飲之

雄黃毒防已煎取汁飲之

砒黃毒令人心悶取諸羊熱血飲之又宿冷猪肉及  
鴨肉羹冷食之又黑鴉煎取飲之

碯砂毒生菜豆水研取汁一二升飲之

砒礬毒令人煩燥如狂心腹攪痛面口青黑四肢逆

冷須臾不救急取黑鉛四兩磨水一椀灌服即解  
如無黑鉛則青藍汁一椀灌服或香油一二升灌



服又人糞汁多灌之又地漿三碗和松粉頻灌旋  
刺猪狗羊鷄鴨熱血飲之又臘月猪膽水和服之  
立解又稻稈灰淋取汁冷服一碗毒隨利下又冷  
水研萱菜取汁飲之又藍根砂糖搗爛和水服之  
白蠟五六錢搗細冷水調灌

### 解金石毒

中毒者取黑松一斤鍋內煨成汁投酒一升如此十  
數遍候酒至半升去松怕服之黑豆汁藍葉汁水  
芹汁白鴉屎淋汁皆宜

### 解金銀銅錫鐵毒

金銀銅錫鐵毒服水銀即出又鴨血飲之又白鴨屎  
淋取汁飲之又生鷄卵吞之又黑豆汁或藍葉汁  
水芹汁飲之○錫胡粉毒杏仁研汁服之○鐵毒  
者磁石飲之肥猪肉煮冷食之又猪脂服之

### 鮮盡毒

凡有盡之疾門限屋梁無灰塵潔淨當用心防之入  
盡鄉遇飲食以犀角攪之白沫殊起者是盡也遇  
食盡家潛於初下筋時收藏一塊在手盡喫不病  
少頃却將所藏一塊潛埋於人行十字路下即盡  
於其家作開盡主必反求求救或食時讓主家先



動節或明問主脈云莫有盡麼以筋等卓而後倉  
則盡不能乃唐○中盡毒者心腹切痛如有物咬  
面色青黃或吐血或下血不即治蝕五臟盡則死  
死後病氣流注染著傍人○驗盡法令病人朝起  
取井水唾水中啞如柱脚直下沈者是盡也浮者  
非盡也又嚼生黑豆不腥嚼曰瘡味甘者中盡也  
又煮一鵝卵去皮日夕含口中勿令破夜吐出血  
霜露中朝看色大青者是盡也○驗盡法取鼓皮  
燒為末水調服一錢病人須臾自呼盡主姓名令  
取盡去即愈又取葉荷葉審其病人卧席下勿令

知病人自呼盡主令取去即愈○取藁蘇葉搗取

汁服之

周礼以藁蘇葉煮盡毒

○治盡法紫金錠半錠

重者一錠用薄荷湯化下又服玉樞丹一錠或吐

或利而愈又白礬甘草等分為末清水調下或吐

黑涎或瀉下即安又甘草湯服之又什麻一兩水

煮取濃汁服又馬薊根為末水和服一二錢又鮮

木北蔞白皮濃煎取一升空心服并即吐盡又馬

兜鈴根為末一兩水煎頓服當吐盡未快再服又

南陸末和水服又續隨子去皮研為末和水服一

錢又班鳩一枚去頭足翅研為末和米飲服并即



下蟲又班描去豆翅熬大戟桃白皮束引者三物  
等分乃末冷水調服半錢其毒即下若未出更一  
服奇效且單服大戟亦好又蠶退紙不拘多少以  
麻油紙燃燒存性乃末新汲水調一錢頓服雖面  
青脈絕昏迷口禁吐血者即甦又藍葉汁飲之又  
苗根濃煎服之又與葉荷同煎飲數升即愈又結  
梗搗汁飲之危重者亦甦又蚯蚓十四枚醋一升  
漬之剉死但飲其汁則下血如爛肝已死者皆可  
活又蜈蚣炙乃末和米飲服亦可又狐五臟及腸  
和五味煮作羹食之各食亦良有人病蟲夢食狐

病自消瘳而有批入室烹食迹差。○有人在海西  
買鰾鰾醃患腹痛甚暴知其中毒盡即多飲燒酒  
乃吐所食醃物已蠢動作魚形其病遂愈

### 解馬毒

馬毒瘡婦人月經血塗瘡仍飲之又生粟及馬遷莧  
搗付之又飲馬遷莧汁又飲馬糞汁以馬尿洗之  
又糯米飯冷置瘡上即愈。○馬汗入瘡毒氣攻作  
心悶欲絕燒粟稗灰濃淋作汁熱煮蘸瘡須臾白  
沫出盡即差。○日沫即毒氣也。又馬肝毒氣引入如  
紅線光以鍼刺瘡口出血烏梅和核爛研醋調塗



之又馬蓬莩取汁飲之又生烏頭末付瘡上良久  
黃水出立安又白礬枯黃丹砂等分調貼瘡上又  
馬汗及毛入瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立  
愈○開剝死牛馬中毒遍身生紫疱俱潰時痛急  
服紫金錠吐瀉即愈

### 解烟熏毒

炭烟熏人頭痛嘔吐涎致死生薤薑搗取汁飲之  
即解無生則薤薑子水研取汁服亦解

### 治湯火傷

烟瘡痛牛屎濕付之又醋澤付之又漿汁塗之又白

蜜塗之止痛又蛭蛭持付之又以好酒洗以鹽付  
之又槐子末鷄子清調塗又大黃末蜜水調塗又  
炭末香油調付并即差○凡被火傷即以醋水塗  
之仍貼以紙連塗令濕惟至焦爛止痛後又無痕  
又毛段燒作末油付又新尿塗飲之以月經水洗  
之○取厨下溝水塗之神效

治熱油傷

蕎麥粉調傅之又寒水石末油調塗之痛立止

治金刃傷

金瘡傷重暈絕不省人熱尿多灌即甦童尿尤好又



便

傷重痛悶欲死納牛腹中即甦。金瘡血不止急  
以石灰末裹之。又石灰末和鷄子白火燉為末搗  
之立止。又梁上塵取傅之。又蛇倉草搗傅之。又塵  
錢細如珠兩汁點傷處。牛蒡葉入鹽少許搗付藍  
葉汁入牛黃麝香少許塗之。失血則常渴然須  
忍之。可與肥脂之物以止其渴。金瘡腸斷一頭  
見者不可連兩頭見者可連續之。先以鐵線續其  
斷腸。便取鷄冠血塗其隙。勿令氣洩。即推納之。  
金瘡腸出不斷者。急以清油拭活。推納之。續以桑  
白皮作線縫合。肚安。取鷄冠血塗之。而外重皮則

不縫糝藥仍服通利藥勿令二便秘澀若腸與脂  
膏俱出用手摩去膏不妨此是閤內放心去之然  
後推腸入納初飲粥清二十餘日乃喫糜粥百日  
後乃可進飯○金瘡腸出不能納者小麥五升水  
九升煮取四升去滓令極冷使人含嚥瘡上及背  
則漸入勿令眾人見又新汲水噴之令身寒腸自  
入并勿令病人先知○使四人執病人卧席牽搖  
之腸自入○乾人屎抹於腸○即自入○凡金瘡  
忌嗔怒及大言笑動作勞力及食醢醢熱酒熱羹  
皆使瘡痛衝發甚者即死○凡金瘡及折傷不可



飲冷水血見寒則凝入即死。凡金瘡及墮傷折  
湯更有瘀血滯積宜先逐去瘀血化藥石四兩流  
黃一兩乃末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾每四方博  
上以炭火從巳午時煨至紅扁候冷取出研細先  
將傷處其血化為黃水每取一大匙重尿入酒煎  
熱調服則臟腑瘀血化為黃水或吐出或下注。○  
刀斧傷桑白皮剝取葉之汁入瘡中又蘇木末  
付之蠶豆包付數日如故又急取白糲付之藍葉  
汁飲之

治砲矢傷

戰陣砲矢所傷流血滿身肉絕者牛一隻剖腹納其  
人浸血中即甦○箭簇入骨不可拔取燒蠟全者  
入麝香少許煮末罨之即出又鼠腦及肝塗之又  
蟻蛭同礞黃研汁自出○毒箭傷芋根搗付日夜  
敷易藍葉汁飲之

### 治打撲傷

瘀血在內煩悶欲死蒲黃三錢熱酒調服又白楊樹  
皮酒漬飲之又生麻根葉搗取汁飲之升非時則  
取乾麻煮汁飲又童尿熱飲一二升即甦又大尿  
燒存性為末熱酒調服二匙大膽一枚分二次溫



酒調服惡血盡下打撲傷痛不可忍取蔥白入  
爐火煨乘熱辟開其中有滓便是傷處冷則易熱  
者復更痛定又芥子和生薑研微炒貼之亦妙

### 治墮壓傷

凡墮壓死者心頭溫者可救急去衣以袖好掩其口  
鼻上一辰頃候眼開先灌熱小便又薑汁香油攪  
勻灌之又蘇合元三五元溫酒童便調灌即甦○  
松煙入好生酒灌之○半夏或皂角末鼻吹得嚏  
亦甦○被墮壓或舟車輾馬蹄牛觸腦腰破陷四  
肢摧折氣悶欲死烏雞一隻后毛千杵和醋一升

以新布搗病處取藥塗布上乾定乾則易之竟寒  
振欬吐不可去藥須更後一鷄神效又烏雌鷄右  
翅羽七枚燒灰和酒服痛吐血便愈○墮壓傷瘀  
血疼痛取水蛭炒焦麝香等分末熱酒調一錢  
服又稻稈燒灰兩新熟和糟酒淋灰取汁末溫淋  
洗痛處立差

### 治骨折筋斷

折傷筋斷骨碎生地黄取汁和酒溫服滓付患處又  
生地黄熬之裏湯處一日一夜十易一月筋骨連  
續又取蟹腳髓及殼中黃微熬納瘡中包裏即連



筋骨又取牡鼠生搗付之三日一易又高薑子微  
炒末酒服二三錢能接續筋骨○骨折取自然銅  
火煅醋碎七次研極細水飛同當歸沒藥末各半  
錢溫酒調服仍以手摩傷處此藥直入骨損處求  
之神效此藥新煅者有毒若不折骨不碎骨則不  
可用○山梔生乃末五分飛羅麵三錢薑汁和搗  
患處一日夜皮肉青黑是其驗也○腦骨破蔥白  
和蜜細研厚傅損處立差又取夜合樹皮去麋皮  
剉炒黑色四兩芥菜子炒研一兩末每二錢熱酒  
調澄清臨卧飲滓是傷處也○被研筋斷急取旋

覆花根搗汁灑瘡中澤付傷處半月便續

治手足折傷

手足折傷出血痛不可忍急用白礬末一匙和沸湯  
一椀米熱重洗傷處痛止若出血外則須搗入內若  
出血內則須搗入外看骨破出血蔥頭粉尾上炒紫  
色熱酒醋同調成膏厚傅傷處用桑木或柳木尾  
夾定麻繩縛扎時鮮扎拽屈拽直否則愈後曲  
直不得成痼疾○接指方蘇木為末敷於斷指間  
接定外用蠶繭重包縛數日如故○跌傷作腫痛不  
可忍梔子白麵為末水調搽之乾則灑水即效



治肢節脫解

四肢節脫但有皮連不能舉動名筋解黃芩三兩酒浸一宿取出焙乾為末每二錢酒下

治耳鼻舌傷

治擦落耳鼻用油髮灰末乘急以所落耳鼻蘸髮灰綴定以軟帛縛定神效○顛仆穿斷舌心血出不止取米醋以鷄翎刮所斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許蜜調噙化而愈

治瘡瘍傷破

有人落馬被所佩鎖匙傷破陰囊二九脫落懸掛未

新痛若無任有醫教其人漫托上多取壁錢敷貼傷處日漸就安其藥如故

### 治杖傷

杖傷忍乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者抱瓦杖畢即用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚物仍用蔥白搗爛炒熱搽杖處冷則易之止痛散瘀止痛又瓦豆腐鹽水煮熱鋪杖處其氣如蒸豆腐即緊後換貼之以色淡為度潰爛者亦宜又鳳仙花連根葉搗爛貼之乾則易一夜血散即愈又痛甚者以熱酒盡量而飲刺出惡血以大黃黃柏



房末生地黄汁調付之。○大黃房末童便調頻付

治人咬

人咬成瘡。極或驚甲燒灰油調付

治熊虎咬

熊虎咬甲傷。嚼生栗付之。○熊傷人。煮葛根取濃汁。以洗瘡。十度。并持葛根為末。調葛根汁。服五次。○虎咬。湯生葛汁飲之。又洗瘡。又梓莢取汁飲一升。日三。澤付傷處。又飲清油一椀。又白礬房末。納傷處。又飲酒。盡后大醉。當吐毛虫。良。又砂糖水調服一二椀。并塗傷處。又生雞內食之。又月經赤衣。

燒為灰和酒服

一方月經衣所酒  
服方寸匙日三

○月經衣布付

之傷處又白礬末納瘡中裹之

洗牛解腸出

腸出不刺者意以清油模腸用手推入以桑白皮尖

縫后肚皮縫上糝血竭末或百草霜末○以熱尿  
常洗之或枸杞根皮煎湯洗之妙

洗馬驢驢咬蹄

馬或驢咬人取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳○

馬咬蹄取益母草搗爛和醋炒付又搗頭栗子嚼  
付之燒灰貼亦妙又取鷄冠血熱塗之又用艾葉



傷處取人尿或馬屎燒灰乃末付之○被驛跑倒  
又咬傷膿潰臭惡蛆蟻極盛服蟬花散

### 治犬咬

春夏初交犬多發狂但見其尾直下以捲口中涎涎  
舌黑者卽是狂犬若被其咬九龍一生急用鍼刺  
去血以熱小便洗淨卽殺所咬犬取腦付之或用  
杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬蘭根研細蔥湯  
洗後塗之急用班貓七箇去頭且翅乃末溫酒調  
服其毒已洩小便中出可將尿既感清水今患人  
尿其中得半日見濁氣凝結如狗形則毒既出無

則須服七次極驗若小便流盜元散水調服一方  
班描七日内用七角七日外每日加一箇十日十  
箇百日百箇去翅足糯米同炒滑石一兩雄黃一  
錢麝香二分半末溫酒調服不飲酒者米飲下  
毒洩大小便出即愈○患人頂心有一二三紅髮  
即拔去後服藥快效又常食杏仁以防其毒或作  
粥食之又常服韭菜常飲韭自然汁又葛根汁飲  
之又蚘蚋糞封咬處出大毛神效○咬瘡久不差  
口吐白沫叫喚作大聲乃大毒入心也蟾蜍作膽  
食數次勿令知又取後兩腿持爛酒調服亦可又



虎頭骨虎牙虎脰骨各末酒調服二考。虎膽和  
水服又黑豆煮汁服。○洗法年出於灸只取咬牙  
跡上一日灸三壯至一百二十日乃止永不復  
一方連灸限三  
月切令完全  
○禁忌法被咬者終身禁食犬肉  
及蠶蛹此毒并符則不可救三年內忌食一切毒  
物及房事又忌飲酒

### 治猪咬

屋漏水洗之又松脂作餅付之

### 治猫咬

取薄荷葉細嚼付之又虎骨虎毛燒為末塗之

洗鼠咬

取楠毛燒灰麝香小許津唾調付。○楠葉塗之。○生  
薑擦楠口兩處塗之

治蛇咬

蛇咬頸塗人乳汁又青魚白卵沉水待潤貼之即效  
○治蛇毒如雄黃取末細貼瘡口立效又萬草  
汁和雄黃末貼瘡口毒水流出腫毒即消又即以  
白礬火上焙汁滴咬處立差無白礬則速作艾炷  
灸五壯良又中蛇毒眼黑口禁欲死蒼耳嫩葉一  
擔搗取汁溫酒和灌之瘡上又白芷末麥門



冬湯調服。痔付湯處。又毒蛇螫急。以熱人尿洗出。  
血次。取口中唾塗之。又取人屎厚付布裹。即消。又  
急。取酢二椀。令毒氣不隨血去。清油亦可。又凡  
蛇毒。取獨頭蒜。或小蒜。或薤。或苦苣。或豆葉。或水  
荏葉。取。飲。痔付之。又生蠟。蟻。搗付。又生。鷄卵。敲汁。  
作一小孔。后咬處。又半耳中垢。堵耳中垢。取付之。  
○即刺自己耳中腦子。納傷處。○真末和冷水服。  
又和水作餅。付咬處。及浮氣去處。即消神效。○忌  
食酸物。梅子。杞之。七。大痛。○蛇入耳鼻口中。捉  
出。急以刀。破。蛇尾。納川椒。一云胡椒二三粒。裏着。即出。

又以艾炙蛇尾即出又割母猪尾頭瀝血入口中  
并孔中亦出後取雄黃末調人葵湯服刺蛇毒○  
蛇繞身不解以熱湯淋之無湯則令人尿之即解  
○毒蛇尿草木著人似刺剉便腫痛內爛若著手  
足指節墮落研砒礪和膠清塗之○蛇骨刺人腫  
痛燒花鼠屎末付之○大豆葉搗付

治蜈蚣咬

取蜘蛛咬處當自吸毒蜘蛛死即投水中救活更  
用生者吸之又烏鵲血及屎乾則水調塗之又搗頭蒜  
研塗之又蝸牛取汁塗之○桑白皮取汁塗之又



地龍汁塗之又木末作餅付○雄雞冠血塗之

治蜘蛛咬

蜘蛛咬人腹大如孕瘻中出絲處有死者非飲牛乳  
可制其毒又蜘蛛咬遍身成瘡飲好酒大醉去於  
肉中小如米自出又青蔥葉去尖納蚯蚓一條緊  
捻頭勿通氣候化水點咬處即差又藍汁一椀入  
雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁并點咬處腫  
痛垂死者即愈只服藍汁亦好又桑白皮汁塗之  
又鴉冠血塗之又鷄卵敲作小孔合咬處立差○  
醋磨生鐵塗之○壁鏡一名壁鏡即細蜘蛛咬毒人必死桑

灰淋瀝汁調白礬末塗之又醋磨雄黃塗之

治蠱蝥傷

又名八角虫如小蜈蚣色青黑長豆俗号影子虫

此虫隱於壁間以尿射人遍身生瘡如熱痹而大繞腰匝不可療烏雞翎燒灰雞子清調塗之又取扁豆葉按付即差又鹽湯淋漬瘡上數日愈又鷄屎塗之

沈雄螫

青蒿葉付之又薄荷按貼之又茅莖按擦之又冬瓜葉按付之酒糟或醬最薄醇酒塗之又薄荷搗付



治雜虫咬傷

蝸牛咬人毒遍身者蓼子沐浸之即差○螻蛄咬人

石灰醋和塗之

天蛇昂草間黃毒人被其螫因為露水所濡乃成疾

似癩而沸癩煮黍皮汁飲之差

蚰蛄咬雞屎塗之又急煮鹽湯浸洗

五毒虫毛螫赤痛不止馬齒莧搗付之

諸毒虫咬傷大能燃蘸香油燒火吹滅以烟熏之即

愈又小蘗或藍葉搗汁飲又付之○香油浸紫蘇

塗之

諸傷辟蠅蛆法

夏月諸傷損潰爛蛆虫甚盛臭不可近恆退燒存性  
一兩蟬殼青黛各五錢細辛二錢半為末每三錢  
黃酒調下日二名曰蟬花散服之蛆皆化水而出  
蠅亦不敢近又寒水石治夏月諸瘡臭爛

治諸虫入耳鼻

兩韭汁或葱汁或薑汁或麻油灌入并即出○牛乳  
或鷄冠豔血灌入亦出○生薑擦猫鼻其尿自出  
滴入即出又桃葉作枕之亦出又取小銅管於  
耳鼻邊敲之亦出○取鏡與陶器打作聲亦出

治蜈蚣入耳



取薑汁韭汁藍汁灌入即出或猪脂或牛脂炙令香  
置耳邊即出

### 治蛇入耳

取牛乳擠入即出又蝸牛汁或小蒜汁灌入即出又  
地龍入葱葉中化為水滴入其出化為水

### 治蟻子入耳

取醋灌入起行即出又穿山甲燒末水調灌入又炙  
香肥脂或並餅枕卧即出猪肉一指許炙令而沸  
布置耳孔邊即出又燈心浸油酌出

### 治誤吞諸虫

誤吞蜈蚣在喉甚急取生猪肉吃之須臾以清油問

灌口中即吐出繼以雄黃末水調服解毒

誤吞蛇蚘飲牛乳二升自消下

誤吞水蛭取田中乾泥小塊小泥魚三四箇將楮脂

泥勻用巴豆十枚去皮研爛入泥內為丸如常服

大心田中冷水吞下十九粒皆瀉下而愈又濃茶

少飲自下又辰鹽即下為水

治誤吞諸物

誤吞釣鉤連線者莫引之急取珠璫琥珀珠或水晶

珠薏苡子椎至釣所引之自出○市上所在大珠

可用蓋其鉤尖入於珠孔而不礙也

誤吞鐵磁石如車核大磨令光鑽作竅絲穿令含鍼



自出又吞豆豌豆煮熟同韭菜喫之鐵其菜從大

便出

誤吞鐵釘箭鏃多食猪羊肉肥脂物必自裹出又多  
食肥猪肉葵菜自出又豌豆煮熟同葵菜喫之從  
大便出

誤吞釵環竹木蘊白暴令姜黃煮熟切食一大束  
釵即出隨又多食飲糖至數升當果釵環竹木而  
出

誤吞金銀取水銀半兩服之金見水郭如泥清出

誤吞鐵物銅錢恣食蘊薺一名烏羊須臾亦自化出

誤吞銅鐵堅炭為末米飲調服從大便溲出如烏梅

小兒

狀又縮砂濃煎飲之其氣自下又多食胡桃其氣

誤吞木屑擒喉欲死鐵斧磨水灌之

誤吞錢不出煮葵汁冷飲即出根葉子同切

誤吞桃李酸喉不下拘頭煮湯摩頭上差

誤吞髮繞喉不出亂髮灰水調一錢服又白木細梳

末酒調服

治諸骨癭在咽

諸骨癭在咽不下薤白令柔以繩絀中吞到鯁處  
引之輒即隨出又用薤白如上法以荏蕪下引之  
亦出又蝸牛或度筋槌軟如彈丸持筋端吞之後



至鯉處徐、引之鯉著筋即出又綿綿一小塊以  
蜜煮用如上治即出又方絃樵令頭散吞引之亦  
出○藏靈仙為末酒服又為醋吞燕長在喉中不  
久消化○魚鰾骨在咽取鳳仙花膠桐水研取汁  
以匙送下不可犯逆恐致損傷又魚狗鳥小鳥青  
似醉水  
上兩魚食故名為燒灰和水服又萱草根汁飲之  
又偏砂甘草末綿裹含嚥即出吐又飴糖作丸如  
鵝公黃大吞之吞下大作丸嚥下之又鯉魚鰾  
魚鱧魚膽皆下骨凝膈月取者尤佳取皂子許溫  
酒化呷之得吐便出未吐更飲溫酒以吐為妙未  
出更服又鯉魚鱗皮燒作屑和水服即出○玉簪

花醋莫不著盞吞下○大蒜壓臬即出入底角含  
之津嚥下○東流水一盞東向坐以手指水上書  
龍字訖飲之○魚骨燻在咽兩桑木上出屑醋煎  
灌水下自又將倒懸手起涎出拘徐嚥下其骨  
化吞水如神又虎骨末水調服或煮汁服狸骨  
亦可又象牙磨水服即下又鷄足一對燒灰水調  
服○鷄骨在咽野苧根洗淨爛搗如泥兩櫻桃大  
以鷄羹化下立出又白梅肉搗成大丸綿裹用線  
穿在內冷菜送下扯住綿頭在手一嚥即出

治芒刺在咽

竹木在咽兩蠶蛭腦吞下即下又鼠腦唇塗嚥上即



出又鯽魚膽和酒服即出○鯽魚膽和水服即出

稻麥芒在咽喉腫痛急取鴨口中涎灌之即出又脂麻

炒為末湯點服也

治諸物入目

稻麥芒入目不出白葉荷有赤白二種根莖取汁注

目中即出○栗殼煎水頻洗○栗殼刺入眼蟬蟻

取汁注之○稻麥芒在眼以新布覆眼上取蟬蟻

涎布上摩之其芒出着良○麥芒入目煮大麥取

汁洗之即出

沙塵諸物入眼腫痛不得開眼取牛筋搥臂如絲著

睛上輕按之自出又為墨濃磨點睛上以新筆繳

出如又取蜆蛸一枚手指其背於眼上剔之沙塵  
自出○衣魚以乳汁研和注目中自出○鵝肝血

注之

飛絲入目腫痛不得開水墨濃磨點入目中開少時  
其絲自成塊著在睛上却用綿輕拭下即愈又  
頭疳點入目中又刮入瓜甲上細屑以筋頭點津  
法蘸屑入目中其絲自帶拔去之又石菖蒲搥碎  
左眼病則塞右鼻右眼病則塞左鼻神效○菁菜  
汁點之又鹽炒細末點之

洗飛絲入口舌間

飛絲入口舌間生嚼蘇葉以白湯下之立效



治匙著口中

匙自著口中，漸引入，不解落者，由於胃熱之忌，鍼三里即落。又灸匙頭三張，即落。

治諸物入肉

鍼入肉不出，烏鴉翎三五枚燒灰，醋調，晝之自出。又取獲仁者，爛搗，棗脂調，晝之自出。又蟻蚱腦同硫黃研，傳晝之自出。又鼠腦及肝塗之，自出。又磁石著其上，自出。○鍼刺竹木刺入肉不出，鼠腦厚塗之，即出。

竹木刺入肉不出，蟻蚱付之物，又蟻蚱

研即螺贏乃黑色細腰

蜂生研付之，亦妙。又蟻蚱碎付之，即出。又乾羊屎

燒灰和猪脂塗之可免自出又烏雄鷄生塗是之  
自出又人頭垢一名白瘡在額上者是瘡塗之又棠梨生嚼晨  
之又牛膝根爛搗塗之并即出○蒲公英兩白汁  
多塗之又松脂自出者為末裏信自出

魚骨入肉不出嚼吳茱萸付之骨節爛出又象牙末  
厚塗自軟出又魚杓烏燒為末和水頓服又海桐  
煮汁服○白梅肉爛研付之又魚鱗傳之四邊肉  
爛刺即出

### 治魚骨在肚

魚骨在肚中刺痛吳茱萸煎汁一盞飲之骨軟而出  
治鬼擊



得之三衝卒著人如刀刺狀腦腹疼痛不可按抑或  
吐衄下血者謂之鬼擊○犀角五錢朱砂看腐各  
二錢半為末每二錢新汲水調灌○以好酒吹納  
兩鼻即差○鷄白屎麻一握酒七升煮取三升熱  
服發汗○不出則熨斗盛火照兩脅下汗出即愈  
○血漏腹中煩滿欬死雄黃末吹入鼻中又酒調  
一錢服日三能化血為水○灸人中立差不差則  
更灸○灸臍上一寸臍下一寸七壯

### 治鬼魔

人到客館及久無人冷房睡中為鬼物所魔但聞其  
吃、作聲便令人叫喚不省乃鬼魔也不急救則

先不可近前嗅但移動些少卧處徐之嗅之又急  
不可以火照之若元有燈則存之若燈則切勿點  
燈痛咬其足跟及大拇指甲邊多唾其面一云以  
仍用竹管吹兩耳又取半及或皂角末吹兩鼻末  
中即活○標上塵吹入鼻中又以新筆尖刺鼻孔  
男左女右轉轆運動則即起○宜用麝香蘇合元  
○伏龍肝末二錢并水譙一更取入鼻中又取生  
韭汁灌口中及耳鼻藏白汁二寸○若仰卧以手  
覆心則魔不得悟但捻下心上手後徐之嗅夜  
傍人手及他重物皆此大法恒與鬼擊同治

治客忤辟厥



瘡忤者中惡之類也。多於道間門外得之。令人心腹  
絞痛。脈滿。急。衝心。胞不即。後亦殺人。取百草霜五  
錢。鹽二錢。和研。溫水調下。○又取鹽鵝子大。青布  
裹燒赤。研細。酒中頓服。當吐惡物。又取細辛。桂心  
各細末。納口中。○蘇合丸。以薑汁或溫酒或童尿  
調灌。○熟艾一兩。水煎。取汁頓服。即差。○銅花或  
瓦礫。盛熱湯用。皂衣襯腰上。於衣上熨之。冷則易  
便愈。○以皂角末吹鼻。或研韭汁灌耳中。及臍中  
百壯。

### 治尸厥

尸厥者。即中惡之類。身脈皆動。而形神無。知其狀者。

尸故曰尸厥凡邪犯同疾或入墓穴塚中邪惡  
手足逆冷頭面青黑牙關緊急暈倒不知人或錯  
言妄語又腹中氣走如雷鳴聽其耳中如微語拜  
者是也急取蘇合元三介溫酒或薑湯灌下又取  
故汗衣燒末又葛蒲汁灌口中又薑汁半盞酒一  
盞煎百沸灌下仍以竹管吹其兩耳即甦口穢人  
中至靈立甦灸百會七壯氣海穴各二壯

### 治痰厥

痰厥暴盛不省人事喉中如曳舌難辨急取清油多灌  
之即吐痰而愈又竹瀝和薑汁灌下又鵝子黃三  
枚和童溺灌下又竹瀝和薑汁少許多灌之又清



心元一此調即甦

治食厥

食厥者多因飲食過度飲食之後或着氣滯或着寒  
常急暴之症口不能言目不能視人四肢不舉急煎  
薑鹽灌多湯探吐之即甦

治蛇厥

蛇厥之症心腹疼痛暴作暴止惡心嘈亂時煩嘔吐  
冷涎青水面色青黃口唇紫黑色變不常者是也  
若貫心則殺人甚急使君子肉一兩水煎服又若  
練椒白皮一兩湛藍調糖搗末一錢五更頭頓服  
比上平日未頭向上前一日不食夕飯至夜半後

先灸楮肺令香臭滿鼻即細嚼嚥汁隨即服藥  
虫飢求食之時痛時則不拘○方痛之時也不宜  
飲食且食甘則痛後並藥虫食甘則起食酸則醉  
食辛則伏食苦則止○酸石榴取皮二斤槌搗十  
枚水十升煮至二升去渣以粳米煮稀粥早晚  
服之少間虫并死快利○若練取去麋皮兩白  
皮二兩水二瓶煎至一瓊半去渣用晚粳米三合  
煎糜粥空心服○服藥殺虫法先以炒肉一二斤  
吃引虫向上然後進藥粥一二口少頃又吃一二  
口粥加至一瓊或二瓊其虫盡下○三虫求食  
病後腸胃虛虛三虫求食人五臟者謂之狐



或殺人甚急上食肺係則喉門腫痛下食大腸下  
口則肛門腫痛令人不能堪以合欬木燃竈而坐  
於曲廐之上使其烟入肛門又使入口即差

治氣厥

附中氣

氣厥多至於膀胱貴之人因事激惱起急感極不得宣  
泄逆氣上行忽並仆倒不省人事牙關緊急手足  
攣攣狀如中風但口內無涎辨為異急用蘇合元  
或便者附末二錢薑湯調灌則即蘇不可妄用雜  
藥

中氣與氣厥同因與人相爭暴起氣逆而暈倒此氣  
肺多沉風肺多浮風中身溫有痰涎氣中身冷者

痰涎急用薑湯灌救○若中氣而用中風藥治之  
多致殺人

梓上氣

乃大虛氣  
肝藏之病

喉閉其聲如鼾有如此喉響

者此為肺絕之候宜用人參膏救之用薑汁竹瀝  
放兩頻服之如未得參膏先煎獨活湯救至早  
者未全七八次則十全四五遲則十全

治中風

梓並昏仆不省口眼喎斜手足不遂急以手大指爪  
甲撻刺人中皂角末吹鼻即提起頭頂髮候其噴  
嚏有嚏可治無嚏不可治口噤則以烏梅肉和南  
星細辛末頻擦牙口自開○取竹瀝三合薑汁一



合調清心丸一丸或龍腦蘇合元三丸灌口中或  
多灌香油即甦○不省人事延湖不得語者側栢  
葉一握葱白一握并根細研北泥水酒一種同煎  
一二十沸去溫服○風痰壅盛者口眼渾喎斜不  
能言語者皆灌吐之輕者取瓜蒂末一錢溫水調  
服重者取藜蘆五分入麝香半錢為末薑汁調服  
如不吐再服之○用白礬二錢生研作末生薑白  
芷汁調和開口灌下其涎或吐或化下便醒○口  
眼喎斜向左則右灰水調即於右邊塗之向右則  
左邊塗之候其方正如此即以小水洗下大效○身  
如角弓反張四肢不收煩札欬死者清酒五升鵝

白天一升搗篩和合拂之千遍乃飲之壯者服一  
升日三度弱者服五合差口炙足大指橫紋隨年  
壯五愈

治中暑

夏月在道中中暑先者及昏冒痰厥吐瀉喘滿大渴  
汗出頭眩煩燥欲死者急扶在陰涼處取道中熱  
塵土積心上及臍上仰臥令人尿其中即活○以  
布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續以熱湯淋布  
上令暖微臍腹如倉卒三湯掬送止熱土積於臍  
上冷則易之○以新汲水滴兩鼻孔以扇扇之重  
者地灌之即醒若此冷水飲即危上將書○生薑一大



塊或大蒜一大瓣水研灌之。○童便或清醬和水灌之又生馬通飲汁灌之。蓼葉香油煎灌又石膏一兩煮取汁灌之即差。○取大蒜一握路上一日曝土雜研以新汲水知之。瀝去滓灌之藥到腹中即甦。此神人傳急方也。○使人噓其心令煖易人爲之。○槐花軟筍濃煎服即效後不復發。○真末調冷水服蜜水亦可。○水驚時妄言尿砂盜汗散并水調服。

### 治中寒

傷寒有即病有不即病。以津而溲中寒則其病即發而暴暈倒。口噤四肢強直拘急嘔吐涎沫脈浮緊。

或微或無若以毫分死在朝夕耳至煖處以手  
炙火摩病人臆脇同取熱酒薑汁各半盞灌下兼  
用葱白二三升分二包炒令熱以熨臆上冷則  
用水拌溫更如熨之○冷極否有風逆無肺陰虛  
偏者多用葱白連根切小麥麩各三升鹽二升以  
水和勻炒熨臆上如上法又炙臆上其氣海肉元  
名三五寸壯一云氣海肉元  
各炙二三寸壯而肺不出手足不溫

者死

### 治噎乳

增槩壯熱頭痛眩暈心痛腹痛不可忍不得吐瀉謂  
之乾噎乳也瀉不止謂之噎乳也乾者以吐瀉止



為主鹽一兩生干切半兩同炒色變以童尿二盞  
用煎至一盞分二次服吐下即愈又鹽一大匙熬  
黃取童尿一升溫和挽服又鹽湯一椀入皂角末  
少許調服探吐又百沸湯和新汲水服之能吐宿  
辰惡毒之物和鹽服之尤妙又鹿皮或獐皮熏烟  
最多黃色者水浸探取汁頓服即吐又飲醋一二  
升吐下○少飲冷水鹽水吐下為佳若痛不止再  
服再吐立效○溫清和吐瀉不止者香薷林檎青  
者皆可煎服又鞣底墨二錢百沸湯一盞投其中  
取汁服即效○牛馬尿絞汁服一杯或炒熟錦粟  
著小服○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末

三錢者三枚薑五片同煎並熱服一服可效或于  
夏末薑汁點服或白礬末一錢沸湯點服亦效又  
灌者凍皮者五錢水煎溫服。霍亂吐瀉之時切  
急挽服吐立瀉止又生薑五兩切牛乳一升同煎  
勿與穀食雜未湯粟粥入胃立施必待吐瀉止過  
半日飢甚方可與稀粥以津而將息。霍亂轉筋  
吐瀉過多遍脘轉筋手足厥冷氣欲絕者急取香  
薷暑者不瀉或木瓜枝葉或林藟治筋轉筋掣搖  
者不忍或蘆花煎服又取葵一把懷煎乘熱熏洗因  
引一二盞。○一治男子以手挽其陰障之女子則  
挽其乳近兩傍障之此千金所法也。○兩衝穴方



鍼刺出血即差

穴在舌名指外過去仙甲角

筋欲絕以鹽填臍中灼艾七壯數立效

疝而臍中有煖氣者依此灸之立愈

### 治攪腸痧

此心腹絞痛冷汗出脈浮欲絕俗謂之攪腸痧與證  
乾霍亂同或如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指  
末微厥或腹痛內辭須臾不救由山嵐瘴氣或因  
飢飽失時陰陽暴辟所致也先濃煎艾湯試之如  
吐即是也亟速低燒乃末熱酒調服立效又少飲  
鹽湯吐之亦愈又法以鍼刺其手指背近心甲半  
分許血出即安先自兩肩按摩下其惡血令聚指

頭刺之又法以手蘸溫水在病者膝內打拍有紫  
黑點處以針刺去惡血即愈又法兩臂腕中有筋  
必致黑色用研針擊刺出紫黑血痛即止○此海  
之地有一急病症似霍亂土人各之曰殺腰痛不  
急治則能殺人其治法以絲繫兩臂中縛常之上  
下則有黑脈度起並尺澤近處而或兩臂皆出或  
只出一臂隨其度起以針刺之出血如射其病即  
止百不一失沙典殺音相近臂腕出血之法又與  
之同所謂殺腰似是挽腸痛沙也

治疝痛

小腹痛不得大小便名曰疝疝痛自臍下上衝名曰



奔豚○凡心痛止連腦脊甚則外腎縮入咬牙反

張冷汗如洗復更不救取川烏梔子仁并炒各二

錢酒各半盞同煎入鹽一撮或加薑服立效又沙

參或桂心或橘核或葱白或玄胡索或牛膝莖或

末服或湯服即差沙參常服至少○貂皮或貂鼠皮是燒

灰酒服調糖黃豆黃又茴香莖葉搗取汁熱酒各

合調服即差又蜘蛛散蜘蛛十四枚熬肉桂五錢為末大人一錢小兒

五分○炒鹽尉痛處○灸揭陰在足

中節下指橫文一云在足大指次指下○千年尾三

七介碎作奕子大列置臍下至橫骨上灸之以陰

囊出限為限○小兒胎疝偏墜囊縫後十字紋上

灸三七春灸及夏灸冬灸又癰疽被針兩掌囊  
中水液或穢液即愈虛樞真訣也

### 治衄血

吐血危重者百草霜末三錢井水調服即止又蒲黃  
炒三錢冷水調服又松烟墨濃磨汁飲之又韭菜  
汁飲之又生地黃生藕生梨搗取汁磨墨徐服  
之即止○藍葉汁服之

衄血不止者百草霜末三錢水調服又吹鼻中又蒼  
草根汁一盞生薑汁半盞相和細呷又和髮灰水  
調一錢服更吹鼻中一方病人頭中又人中白火煨  
入麝香少許研酒調服更吹鼻中○生地黃三五



斤搗汁連服以得塞鼻中又薤白取汁和酒飲之  
○糯米炒黃為末二錢新水調服即止○葱肉以  
病人涎調付血不出邊又牛膝車前葉根汁和蜜  
服○以井水濕紙貼頂心上北左鼻兩指俱扎右  
手中指右鼻兩指左手中指兩鼻兩指俱扎即  
止又以大白紙一張作十數摺浸水令濕置頂中  
以熨斗熨之至二三重乾立止勿令病人知以  
井華水忽然極噴其面即止○大口魚皮蘸水令  
濕塞鼻中亦止

### 治眩暈

米泔水吐瀉頭旋眼花支體厥冷欲死急取枯白礬

末一錢百沸湯點服。若別鹽一匙醋一盞同煎服。  
或鹽梅酸醃皆可煮服。○瘴者渴飲水即死飲薑  
溺最好。自己尿亦好。

### 治狐魅

看狐狸精恍惚走巡山野謂之狐魅。取狐肝炙為末。  
水服一錢。日三。又取腸肚作羹臠飲之。又鷹肉食  
之。甯及瓜燒灰末和水服。又取狐狸皮炙熟黑炭  
為末酒調服并效。

### 辟瘟疫

務成子螢火丸

雄黃雌黃

本草曰精明者為雌黃人

山之陰者為雌黃亦

各二兩螢火鬼箭羽茯苓子白



礬燒各一兩 羚羊角 鍛龜板 鐵槌柄 取入各二兩  
半 右為末 以鷄子黃并雄雞冠血一具和之 如杏  
仁大縫三角 絳囊盛 五九帶臂上 左又方掛於戶  
上 辟瘟疫 惡氣 百鬼 虎狼 蛇虺 蜂蠆 諸毒 及白刃  
盜賊 凶吉 昔劉子南得此方 後與虜戰 敗被圍 天  
至子南馬數尺皆墮地 以為神人 解圍而去 虜○  
太乙流金散 雄黃一兩半 羊角 羚羊 礬石 雌黃 鬼箭  
羽各七錢 半 右為末 三角 縫囊盛 一兩 帶胸前  
并掛戶上 又青布裹中 許中庭炒之 大辟瘟疫○  
七物 虎頭 元虎頭 滑朱 砂 雄黃 各一兩半 蕪菜 豉  
灰 鬼白 都仙 天南 星 不可辨 但 各一兩 為末 右煆

蠟和丸彈大子以紅銷帛盛一丸繫男左女右臂  
上又懸屋四角如值此境疫作晦望夜半當戶燒  
一丸最起者人吞下小豆大一丸則至致傳染  
老君神明散川烏炮四兩附子炮白朮各二兩桂  
梗細辛各一兩右為麝末綿絹帛盛帶之一里人  
皆多病口蘇合香元每取大丸浸一甌清酒中時  
飲之最辟鬼疫之氣又縫囊盛三丸常心帶之  
二好口屠蘇飲白朮一兩八錢大黃川椒桔梗桂  
心各一兩半虎杖根一兩二錢川烏六錢劉盛綽  
藥十二月晦日早晚取出入二甌清  
酒中煎數沸東向飲一盃逆少至老服之三朝以



其澤還沉井中一人飲之一家皆疫一家飲之一  
神效疫。宣聖辟瘟丹臘月十四日平朝取井華  
水盛淨甕量人口多少浸乳香至歲朝五更湯令  
溫涎少至老每人一小塊飲水一二呷燕下則一  
年不患時疫。側柏東向葉採取乾正細末或湯  
或酒調服。神聖辟瘟丹蒼朮二兩羌活獨活白  
芷香附子大黃月松三乃子赤箭雄黃各一兩右  
乃末麴糊和化彈子大黃丹乃水晒乾正朝早晨  
焚一炷。蒼朮燒之辟疫氣乾中糞燒之亦佳。○  
除夜爆竹中庭則辟瘟端午日以艾葉為人懸門  
上。○入瘟家以紙炷蘸香油并雄黃末砌末探入

耳鼻內最能辟穢毒之氣○入疫家先令同啓門  
戶以大鍋盛水二斗置堂中心而蘇合元二十九  
煎之其香能散疫氣病者各飲一匙後醫者乃入  
診視不相染○入疫家行動從容左位而入男子  
病穢氣出於口女子病穢氣出於陰戶其相對坐  
立之間必須識其向背既出而以紙燃探鼻中噴  
嚏乃佳○嚏後鼻穢去皮作末每兩少許吹入  
鼻孔中令嚏半及末止佳此藥以紙燃探鼻  
嚏之

### 治咳逆

傷寒及久病得咳逆者乃惡候取半及五錢生薑二



多細刺水煎服即止。蘇合元三托生薑枳實並  
湯調服即止。皂角末吹鼻清嚏而止。又作又嚏  
凡百餘次遂止。又硫黃二老香乳一老末酒煎急  
令病人嗅其熱氣即止。利兩番枰頭細糯吞之  
即效。

### 治梓噎

梓噎腹下利兩番枰頭細糯吞之即效。

### 治梓失音

失音不能言杏仁桂心各一兩末鹽化櫻桃大綿裹  
管化燕之又橘皮濃煎湯頻服苦竹葉濃煎飲之  
又荊芥蘇葉濃煎服之立效。

治失欠脫頤

因呵欠開車差跌口不能閉合漿水不入以致不收  
取酒灌之令大醉睡中吹皂角末入鼻令嚏即自  
止又鹽梅肉二箇擦牙即閉又南星末薑汁調付  
以帛縛合一宿自愈又法令一人抱定防人頭一  
人以手指摩其頤以渾指之後入笑當疾出其核  
恐受傷○黃蠟照火作炷乘熱貼付緩邊限差  
治眼睛突出

眼睛言故突出一二寸以新汲水灌睛中漬數易水  
睛自入仍以桑門冬桑白皮山梔仁各一錢水煎  
服之○睛眼突出至鼻如角黑色痛不可忍或時



時大便出血名肝脹羌活煎服愈。眼睛被撞打  
突出者眼系未斷即推入胞內用四畔以生地黄  
細搗厚付不令風侵若內有瘀血鍼刺出之自愈

### 治重唇

口唇緊小不能開合飲食不得不急治則死此亦奇  
病名曰重唇急用薑黃仁湯薑黃仁防己赤小豆  
炒甘草炙各一錢半兼用黃柏二兩以五倍子密  
隨傷者二錢甘草二分為末水調塗黃柏炙乾  
再塗再炙盡為度然後將黃柏作薄片臨臥貼  
重唇上天明即愈又白布作燈炷如指大安芥刃  
上炷炷在汗出拭取付唇上日二三度故青布亦

佳猪脂調付尤佳又用青皮燒灰猪脂調搽唇上  
仍將青皮灰末一錢酒調服之又蛇蛻皮或每蟬  
塘燒為灰猪脂調傳

### 治唇腫

唇腫生鼠刺服去腸腑和血付之雖毒腫無不即差  
六月採乾豎耳浸水取汁以雞羽頻塗即效

### 治腦背腫

凡癰疽發腦背至漁必死宜用酒洗大黃及甘草<sup>上</sup>  
每三錢煎服○忍冬花與葉生搗煖水調服又槐  
花四兩炒入酒二瓶煎服○麻油一斤煎十餘沸  
候冷入水酒二瓶和勻分五次一日夜盡服○薤



荔枝葉爛搥研絞取汁和蜜飲之數次。澤付瘡上下  
利即愈。○腫發背如死鵝腸草搥付又伏龍肝末  
酒調厚付頸旁。○背腫以麝香色石如鴉卵者極  
火燒石赤醇醋中投入自有石屑落醋裏頻洗至  
石盡而屑晒乾乃末醋調塗之。○腫毒所及處以  
狗膽墨汁和荏菹根汁圍塗之愈頻愈好。其毒  
暈少挫搦次進塗以至腫頭之傍毒氣厲腫頭成  
膿破腫後付粘米飯最善。及膿榆根皮搥付亦如  
○腦後髮際腫取柏枝<sup>焙</sup>脂大者橫研如馬蹄形  
挿竹慢火灰中素熱點<sup>焙</sup>在腫處以差為度。○腦腫  
初發時以黃沙黃土和水送雜如煎膠陶雜而通

其底安於腫處滿盛地龍又以土作蓋而孔鑿衆  
孔置於地龍盡消更納更壯四五刻於蓋上而灸  
之候其地龍盡消更納更壯連日不輟則腫自消  
○灸法凡癰疽生於腦背初如粟米大或痛或痒  
因作赤色久皆慢忽不為治不過十日而死但於  
腫上灸二三百壯無可愈但早晚灸灸乃佳壯疥  
一二日十灸十治三四日五六治五六日三四治  
七日則亦可灸惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少  
灸之○腫初發不可知癰頭以濕紙封其上先乾處  
是也

# 治疔腫



疔癰初發突起如疔蓋故謂之疔生黃疔中或紫黑  
色初發必先痒後痛先寒後熱四肢沉重頭痛心  
驚眼花若火重則嘔逆多困唇目死牛馬屬熱肉  
而發殺人者一二日之內發在手足頭面腦背骨  
節間者最惡其成處為後又有紅絲疔魚臍疔其  
毒尤甚○次疔兩蟾酥蒸豆許置舌上仰臥兩汁  
逆下又針刺疔心細一孔水中紙貼護之神效又  
燒婦取心下肉貼疔上半日易新者又班點一面  
搥破以付疔上封之又蒼耳莖葉燒灰醋塗之又  
白狗糞和水絞汁服滓付疔上又馬遠覓提和頭  
垢封疔上并神效○疔初發時牛蒡子子各一粒

其頭即出以真末作餅孔之用黃蠟點又白礬煉

化少許入鹽水浸之一晝夜即解煮一云礬入鹽水

差又生大豆一握嚼和此塗之手足疔也○取桑

枝如指大者橫研作馬蹄形插於慢火灰中乘熱

點烙疔處以差為度○疔毒危重將死取土蜂窠

一箇蛇蛻全者一條盛裝大黃泥因燐火煨存性

乃末每一錢空心酒調服少頃腹中大痛止

而其疔已為化黃水矣又甘菊葉甘字搗取汁飲

一升又取葉莖搗付疔上即愈并神效一云冬用根

效

紅絲疔急針其絲出血取白芷汁滴孔中妙



魚臍疔取得公葉連根蔥並葉爛搗取汁和酒服以

澤隨癰左右貼臍下或臍下即安又蛇脫燒灰鷄

子調付瘡上

吸疔毒法取大蜘蛛一箇放瘡上自啣其毒連易三

五箇其毒自敗如蜘蛛因則沉水中以治之為妙

又取蚯蚓入瓦條搗酒搗飲之澤貼四圍留頂出

毒氣○灸法大蒜搗爛塗疔四圍留疔頂以艾灰

百壯以爆為效不爆難愈

手指忽腫痛不可已地榆煮作湯漬之半日愈又黃泥

水調塗指周圍厚一寸許納熱灰中煨之至燥視

皮皺即愈○此毒腫初發土蜂窠上細土醋和為

泥付之柳葉若皮入鹽少許煮洗之○人鬚燒付  
之又鹽湯溫洗日三次水已成濃白丁香塗之三  
潰

治癰疹

清心丸月經水調下極妙又迎火使身特溫燥昂消  
寒薄者最得○樺皮水煎服之又益母草水煎服  
之并有效○石灰和醋塗之○黑紅色癰疹鷄子  
黃赤豆荊芥搗勻塗付

痘瘡經驗方

謹避風寒切禁生冷終身宜守此戒○忌一切香臭  
惡臭凡燒煎油炒煙臭滅燈燭臭燒髮毛羽去糞



穢通溝渠惡臭又忌房中慾淫梳頭並現僧尼外  
人切勿出入要后內外安靜忌食生冷梨紅  
柿西瓜大棗乾柿沉柿柑子橘柚一切酸醃寒  
毒物凡痘熱感自不思食肉而主以存養神  
牽家素餐甚者病免雜葷肉並曰神叔欲戲之  
惶不可耐與契使氣血盈虛而痘疹出而主難  
秘痘家所宜深戒也

初熱三月初發有痛勿論傷寒痘疾急用升麻葛根  
湯葛根二錢白芍藥半錢甘草一錢加入荊芥  
穗鼠粘子炒山查肉各七分○小兒不肯服藥用  
金銀花或忍冬茶以符洋為度而終不加湯藥也

○此時或舒驚搐窒壓目痛切勿把持任其搐搦  
急用牛黃抱龍丸或抱龍丸甘草薄荷等分煎水  
調下瀉青丸亦妙○此時或吐或瀉或吐瀉并作  
自此至出痘後日症雜若劇皆不妨○此時若腰  
痛將五黑陷急用解神湯柴胡一錢半乳葛所  
風者一錢麻黃升麻白茯苓各八分甘草五分煎  
服後溫痰出汗而不汗再服以痛止為度若無藥  
則只宜多汗而能食者免黑陷○此時或舒渴切  
勿與冷水或金銀花露或糯米煎水或三豆飲皆  
可飲又紅花子煎水亦妙

出痘三日仍痛一日即斃者極重二日舒者亦重三



日疥者例也或階戲四五六七日乃出者勿藥之  
類也○此時吐瀉不足憂也○初見紅點急用化  
毒湯紫草茸升麻甘草各一錢加白芍藥一錢少  
查肉七分蟬退去頭翅之五分糯米百粒煎服限  
三日○再服則能令痘稀且無痘後諸症痘疫初  
程之聖藥也○此時又急用乾鰾脂調水白蜜頻  
塗眼眶口唇鼻中以防痘出耳孔砂鉢鰾脂和  
朱砂用有少效○此時痘出太多毒盛急用連  
翹升麻湯連翹一錢升麻一錢此時急用鼠粘子亦  
作末井水調兒付額門以防眼患○此時或發驚  
搐室壅此則逆症也急用加減紅綿湯麻黃去節

去頭翅豆

全竭去毒荊芥穗紫草茸蟬退各五分葱白一莖  
煎服○此時腹痛者痘自腸出故也用蟬退湯胃  
蟬殼十箇甘草一錢半煎服或為末白湯調下即  
效○此時或大渴<sup>求</sup>飲不已紅花子一合水煎服  
或菜豆赤豆黑豆各一合烏梅三個水煎服渴  
自止月經亦宜用○兩月經法糯米一握井水四  
大碗煎至半候冷濃洗月經渴時連續用之蓋糯  
米功痘毒養胃氣止吐瀉雖用十釜終無世賜之  
虞○此時或有四肢百節皆痛者此由痘未快出  
或由未盡和解而然勿藥自愈○此時可以視形  
色不虛稟用藥○出痘終日自初出第三日此時或有痒



症以木麥末糝粉疥癩以手揩摩即止若木麥末

不效用敗草散

勿論郊草穀草多年蓋屋受

末糝

之以手揩摩即效凡瘡或爪破或潰爛流血流汁

處皆可糝之○止痒莫如小楊取溪邊大葉赤枝

之楊剉之六早水煎之長流小極煮六七沸棄其

水煎熱以細巾頻淋洗面頰而久洗方有效故

所以兩光遊易溫之日夜數十次多益好此藥

能引出毒氣故頂陷者皆起如或黑陷要則綿紫

單其大小廣狹而裁之清此水乘熱透付其黑者

皆濕爛毒不入裡如倒靨之類尤見奇效外洗之

藥多過於此自此至落而連日夜洗之冬但月浴

之惡觸風寒只洗面上可也者夏用葉秋冬用枝

寶鑑曰春冬用枝夏秋用葉水一盞入楊五斤○此時必有因痛連用楮

尾膏未泄精小雄猪尾尖以利刀割取血和龍口腦作丸小豆大溫洪湯下或紫草煎水下

聖飲麥門冬桔梗各一錢鼠粘子甘草各五分行

葉三尾如其毒盛用加味犀角消毒飲鼠粘子炒

研二錢防風升麻各七分剉碎穗麥門冬桔梗各

五分犀角屑五分臨服調下或煎服之亦得四貼

日再服

起脹三日自出症痘順者已自昨始有脹意先出者

先起次以漸起凡痘之虛原毒之淺深全在此間

若痘密勢重急用神功散數貼以救之黃芪人參



白芍藥紫草生地黃牛方子仁及名等分前胡甘  
草減半名症臨用神口散盤貼連用內托散黃芪  
蜜炙人芳蒲微川芎厚朴薑炒防風桂枝白芷甘  
草各一錢木香官桂各三分名淡白灰黑脂伏更  
加丁香五粒○此時因賴委德啼號不吐者例也  
○此時多煩渴用紅花子湯或烏梅湯方見上名  
咽痛不可忍口舌生瘡不能吮乳用加味犀角湯  
毒厥上方見加黃芩黃連并連翹各七分煎炒名不  
起脹虛者用保元湯人參二錢黃芪甘草各一錢  
加當歸白茯苓白芍藥微炒各一錢肉桂五分生  
薑一錢糯米百粒○此時若吐瀉則大危急用保

元陽加白芍微炒白茯苓白朮乾薑炒黑肉桂各  
七分犀角屑五分○此時症全白者由元虛者用  
保元湯加膚歸白茯苓白芍藥酒研各一錢倍桂  
七分生干一片糯米百粒數貼以紅活為度痘色  
紅紫者用保元湯加木香膚歸川芎各七分痘色  
太紅退紫者由血虛也用四物湯生乾地黃酒炒  
白芍藥炒膚歸川芎各一錢加黃芩酒炒紫草紅  
花各七分○此時痛甚不可忍則白芍藥細末  
每一錢淡酒調下以黃土細末糝於痛處○此時  
發痒者上出痘後日能用藥○此時水楊湯日夜  
頻淋洗面神可也



貫膿三月

自出瘡至凡瘡順者第六日顆色白已有

向膿之漸七日則面初落氣益加此例也八日  
落氣初減亦能用眼怕痛亦小愈○此時或吐或  
瀉或吐瀉大危急用定中湯兩真土黃土一塊置  
碗內以百沸湯泡之以蓋合之候冷右用兩酒盞  
和水飛末砂末五分水飛雄黃末一錢小加砂糖  
溫服○此時宜以銀針刺之橫貫瘡頸則汁自流  
出極妙尋銀針則竹鍼七次○此時必發痒頸以  
水楊湯點之或有痒甚爪破者後以瘡痕以細布  
裹手指就其痒處按之甚緊則或有顆粒自破汁  
出亦不妨○此時熱候必盛連用月經間以枳尾

膏以降熱、極者多用以脰中夾此乃度不並熱

自入內終至危境慎之慎之

收盤三日

自出至九日十日而補、直黑成亦時也

此時必有大熱或

引飲異常預備糯米飲月經稀尾膏藻隨量痛飲  
以脰中夾此乃度不輕者或可生熱此發熱者十  
常八九矣○此時必有臂脚手足之痛蓋面部既  
已成盤叔手足方欲脹膿浮氣益加之致元非別  
症此則可必瘡也○此時或有白睛上紅絲微漫  
中有凸出之壯者症出而此也仍為瞖目犯黑睛  
而成白點氣血免後之後雖有勿藥之喜而豈可  
信其自愈而不急治乎惡涼作細末和井華水作



餅貼付額上日易妙○此時有泄瀉再或赤白痢  
者皆瀉熱而斂也數日後自差不必用藥如氣血  
俱虛熱乘其源而斂者日將加重終至難治急用  
保元湯加白芍藥微炒白伏苓白朮土炒各一錢  
肉豆蔻肉桂黃連酒炒乾干炒黑各七分連用數  
貼○此時手足臂脚所出之痘方收肥脹臃刺出  
汗可止法見貫標條○此時有腰痛者用蟬退湯  
坊見而此可效用木香理中湯木香人參白朮乳  
干炮甘草炙各五分加鼠粘子炒研黃連酒炒各  
五分○此時膏肓之痛在中脘近處者辟瘟散心  
也急用乳香二錢水一盞煎服只有脊痛者由

瘀血而作韭菜汁用之可也。此時觸風寒而  
腦脹急痛者候以霍亂若以霍亂治之則必致大  
危多用消風散荆芥穗甘草各一錢人參白茯苓  
白朮各以等分防風藿香蟬退各錢三錢羌活各五  
分陳皮厚朴各三分加柴胡七分青皮五分入  
細茶一撮煎服三四貼即效。此時有手足戰掉  
或頭眩氣虛致此也宜用保元湯加當歸白芍藥  
酒炒白茯苓各一錢肉桂七分。此時瘧虛濕爛  
不愈治法上同而更加白朮土炒一錢以養乃度  
。此時有陰虛浮大耳長者大如瓠瓜小如大  
如鷄卵瘧毒與熱濕下注而然也急用消毒飲單



粘子炒研二錢荊芥一錢防風甘草各五錢加黃  
甚效酒炒生地黃酒洗白芍自愈者白龍膽各五錢數貼甚  
效此症勿藥自愈者多○此時有心瀉并作者  
宜用定中湯坊見虛嘔者亦效○此時能睡呼之  
不應効其乳食甚不肯喫病起氣因而然也宜用  
保元湯加白芍藥酒炒當故身白茯苓歸粘子炒  
研者一錢肉桂七分干一瓦糯米百粒同煎服之  
氣短能睡者亦用右藥而難救者甚多○此時諸  
症難名若氣短氣虛者嘔泄者皆睡者不省者夜  
，盡敗症俱見者宜用四聖回天湯人參黃芪  
當故身各二錢石雄黃水飛末二錢臨服時調下

如或黑陷加白木二葉以差為度然以此葉即全  
有亨所製也別多的指之症而形勢則極危該用  
此藥頗有回生者蓋參芪補氣當收補血雄黃序  
脾胃治痰毒也也○此時諸語見鬼者熱也昏、  
不省者七熱也月經指尾脣等葉連續用之可也  
若症危惡似不能救者則法治同黑陷○此時眼  
有赤白翳者可以急治而氣逆未復之前輕用此  
葉非徒無益亦眼速或有困於死者必須候得之  
後方可葉治而又或自癒者有之○反睛之症必  
多於西曆之時而其形如上睛之元凶倒豎或  
直豎向前所見異常或上睛之內有紅肉垂下有



此症者情悅而省或狂言見鬼蓋形症在方之所  
不補而眼胞屬脾胃想五臟熱入脾胃故也自修  
方文曰連翹石膏湯連翹石膏研甘草煎水飛  
名一錢半葛根生切炙山桅各七分升麻赤茯苓  
赤芍藥各五分甘草三分加黃芩酒炒黃連酒炒  
各七分急用之輕者二貼重者三四貼用煎神效  
十無一失○此時諸症或吐或瀉或眼赤皆已  
暑熱於上者以其藥治之可也

Vertical columns of faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



卷之六

自是也  
一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

司準禦侮將軍行忠武衛副司果張文郁  
禦侮將軍行忠武衛副司果張道行  
直署將軍行忠武衛副司果高時俊  
直署將軍行忠武衛副司果全壽明  
直署將軍行忠武衛副司果趙光益全校











